

Falterbestimmung: Unterscheidung von Lampropteryx suffumata, Eulithis prunata und Ecliptopera silaceata (Geometridae)

Zur Unterscheidung von Lampropteryx suffumata, Eulithis prunata und Ecliptopera silaceata (Labkraut-Bindenspanner, Dunkler Haarbüschelspanner und Braunleibiger Springkrautspanner)

Lampropteryx suffumata Labkraut-Bindenspanner

Basalbinde = flaches W
basalwärts, 2 Zacken
ins Mittelfeld



Vfl-U ohne Apexteiler, nur
Reihe weißer Punkte



Eulithis prunata Dunkler Haarbüschelspanner

Basalbinde steil ins Mittelfeld,
zum Innenrand hin oft
unterbrochen



Apexteiler (Dreieck) Vfl-U
deutlich



Ecliptopera silaceata Braunleibiger Springkrautspanner

Basalbinde basalwärts
breit U-förmig,
1 Zacken ins Mittelfeld




Apexteiler (Dreieck) Vfl-U
undeutlich



Lampropteryx suffumata Labkraut-Bindenspanner

Basalbinde = flaches W
basalwärts, 2 Zacken
ins Mittelfeld



Vfl-U ohne Apexteiler, nur
Reihe weißer Punkte

Eulithis prunata Dunkler Haarbüschelspanner

Basalbinde steil ins Mittelfeld,
zum Innenrand hin oft
unterbrochen



Apexteiler (Dreieck) Vfl-U
deutlich

Ecliptopera silaceata Braunleibiger Springkrautspanner

Basalbinde basalwärts
breit U-förmig,
1 Zacken ins Mittelfeld



Apexteiler (Dreieck) Vfl-U
undeutlich

