


Falterbestimmung: Unterscheidung *Mesoleuca albicillata* und *Ligdia adustata* (Geometridae)

Zur Unterscheidung von *Mesoleuca albicillata* und *Ligdia adustata* (Brombeer-Blattspanner und Pfaffenhütchen-Harlekin)



	<u><i>Mesoleuca albicillata</i></u>	<u><i>Ligdia adustata</i></u>
Apex (Flügelspitze)	nie hell	immer ein helles Feld
Hinterflügelrand	nicht wellig immer eine helle, bogenförmige, "ordentlich"	immer leicht wellig
Submarginallinie	wirkende Wellenlinie, die vor dem Vorderflügel- Hinterrand verläuft.	fehlt bzw. verschmilzt förmlich mit dem Saumfeld.
äußere Wellenlinie	die das Mittelfeld zum Saum hin begrenzende äußere Wellenlinie ist hier einfach, aber oft auch doppelt angelegt: dann dazwischen oft mit gelber Zwischenlinie. Direkt unterhalb dieser Wellenlinie immer hell.	Unterhalb der äußeren Wellenlinie befindet sich ein braunes Band, das über den ganzen Vorderflügel bis zum Hinterrand geht.
Saum	ohne besondere Zeichnung	Hier ist der Saum stets mit strichförmiger bis dreieckigen Zeichnungen versehen.